

Resistenzlage August-Viktoria-Krankenhaus 2019

Zeitraum: 01.01.2019 bis 31.12.2019

Anteil der resistent getesteten Erreger in Prozent (%)

	Anzahl Testungen	Penicillin	Oxacillin	Ampicillin	Ampicillin/Sulbactam	Piperacillin	Piperacillin/Tazobactam	Cefazolin	Cefuroxim	Cefotaxim	Ceftriaxon	Ceftazidim	Aztreonam	Imipenem	Meropenem	Gentamicin	Gentamicin HL	Tobramycin	Ciprofloxacin	Moxifloxacin	Tigecyclin	Co-Trimoxazol	Colistin	Vancomycin	Teicoplanin	Erythromycin	Clindamycin	Linezolid	Rifampicin	Fosfomycin	Daptomycin	Fusidinsäure
Staph. aureus* ¹	587	n.d.	9	n.d.	9	n.d.	9	9	9	9	9	n.d.	n.d.	9	9	2	n.d.	2	21	18	0	3	n.d.	0	n.d.	17	16	0	0	1	0	3
Koagulase neg. Staphylokokken* ¹	1503	n.d.	56	n.d.	56	n.d.	56	56	56	56	56	n.d.	n.d.	56	n.d.	28	n.d.	29	42	39	0	22	n.d.	0	n.d.	56	38	0	3	42	0	34
Enterokokken* ²	1625	n.d.	n.d.	11	11	11	11	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	11	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	100	n.d.	0	99	n.d.	3	1	n.d.	n.d.	0	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
E. coli	1905	n.d.	n.d.	49	45	48	16	n.d.	18	12	12	n.d.	n.d.	12	12	6	n.d.	n.d.	20	27	0	25	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Klebsiella	719	n.d.	n.d.	100	24	100	19	n.d.	14	8	8	n.d.	n.d.	0	0	3	n.d.	n.d.	10	15	2	10	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Enterobacter	297	n.d.	n.d.	97	98	27	21	n.d.	99	20	20	20	n.d.	1	0	0	n.d.	n.d.	2	11	3	3	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Proteus	567	n.d.	n.d.	47	32	22	3	n.d.	15	3	3	3	n.d.	6	0	7	n.d.	n.d.	11	52	n.d.	21	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
P. aeruginosa	340	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	13	12	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	9	11	17	7	3	n.d.	2	12	n.d.	n.d.	n.d.	0	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.

Resistenz < 10%
Resistenz 10-49%
Resistenz >=50%
n.d. nicht getestet

*1: Ampicillin/Sulbactam, Piperacillin/Tazobactam, Cefazolin, Cefuroxim, Cefotaxim, Ceftriaxon, Imipenem, Meropenem sind von Oxacillin/Cefoxitin abgeleitet

*2: Ampicillin/Sulbactam, Piperacillin, Piperacillin/Tazobactam sind von Ampicillin abgeleitet