Resistenzlage Ida Wolff 2019

Zeitraum: 01.01.2019 bis 31.12.2019

Anteil der resistent getesteten Erreger in Prozent (%)

	Anzahl Testungen	Penicillin	Oxacillin	Ampicillin	Ampicillin/Sulbactam	Piperacillin	Piperacillin/Tazobactam	Cefazolin	Cefuroxim	Cefotaxim	Ceftriaxon	Ceftazidim	Aztreonam	Imipenem	Meropenem	Gentamicin	Gentamicin HL	Tobramycin	Ciprofloxacin	Moxifloxacin	Tigecyclin	Co-Trimoxazol	Colistin	Vancomycin	Teicoplanin	Erythromycin	Clindamycin	Linezolid	Rifampicin	Fosfomycin	Daptomycin	Fusidinsäure
Staph. aureus [*1]	73	n.d.	14	n.d.	14	n.d.	14	14	14	14	14	n.d.	n.d.	14	14	0	n.d.	0	42	39	0	1	n.d.	0	n.d.	21	19	0	1	4	1	4
Koagulase neg. Staphylokokken [*1]	82	n.d.	81	n.d.	81	n.d.	81	81	81	81	81	n.d.	n.d.	81	81	54	n.d.	54	70	69	3	41	n.d.	0	n.d.	83	72	0	3	51	0	38
Enterokokken [*2]	275	n.d.	n.d.	37	37	37	37	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	37	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	100	n.d.	0	99	n.d.	10	6	n.d.	n.d.	0	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
E. coli	234	n.d.	n.d.	55	50	55	18	n.d.	17	12	12	n.d.	n.d.	0	0	4	n.d.	n.d.	20	27	0	26	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Klebsiella	115	n.d.	n.d.	100	29	100	19	n.d.	14	7	7	n.d.	n.d.	0	0	0	n.d.	n.d.	6	10	8	6	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Enterobacter	32	n.d.	n.d.	100	10	38	38	n.d.	100	34	34	34	n.d.	0	0	3	n.d.	n.d.	3	9	6	0	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Proteus	82	n.d.	n.d.	60	41	41	7	n.d.	25	8	6	7	n.d.	8	0	14	n.d.	n.d.	20	52	n.d.	30	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
P. aeruginosa	77	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	23	22	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	18	16	25	12	5	n.d.	3	11	n.d.	n.d.	n.d.	0	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.

Resistenz < 10% | Resistenz 10-49% | Resistenz >=50% | n.d. | nicht getestet

[*1]: Ampicillin/Sulbactam, Piperacillin/Tazobactam, Cefazolin, Cefuroxim, Cefotaxim, Ceftriaxon, Imipenem, Meropenem sind von Oxacillin/Cefoxitin abgeleitet

[*2]: Ampicillin/Sulbactam, Piperacillin, Piperacillin/Tazobactam sind von Ampicillin abgeleitet