

Resistenzlage Klinika im Friedrichshain und Prenzlauer Berg (KFH/KPB) 2019

Zeitraum: 01.01.2019 bis 31.12.2019

Anteil der resistent getesteten Erreger in Prozent (%)

	Anzahl Testungen	Penicillin	Oxacillin	Ampicillin	Ampicillin/Sulbactam	Piperacillin	Piperacillin/Tazobactam	Cefazolin	Cefuroxim	Cefotaxim	Ceftriaxon	Ceftazidim	Aztreonam	Imipenem	Meropenem	Gentamicin	Gentamicin HL	Tobramycin	Ciprofloxacin	Moxifloxacin	Tigecyclin	Co-Trimoxazol	Colistin	Vancomycin	Teicoplanin	Erythromycin	Clindamycin	Linezolid	Rifampicin	Fosfomycin	Daptomycin	Fusidinsäure
Staph. aureus ^{*1}	1506	n.d.	8	n.d.	8	n.d.	8	8	8	8	8	n.d.	n.d.	8	8	2	n.d.	2	18	15	0	2	n.d.	0	n.d.	17	14	0	0	1	1	3
Koagulase neg. Staphylokokken ^{*1}	1560	n.d.	53	n.d.	53	n.d.	53	53	53	53	53	n.d.	n.d.	53	53	27	n.d.	26	43	40	0	19	n.d.	0	n.d.	58	43	0	4	42	0	30
Enterokokken ^{*2}	1600	n.d.	n.d.	23	23	23	23	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	23	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	100	n.d.	0	99	n.d.	8	4	n.d.	n.d.	0	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
E. coli	2092	n.d.	n.d.	48	44	47	16	n.d.	17	13	13	n.d.	n.d.	0	0	6	n.d.	n.d.	19	26	0	24	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Klebsiella	885	n.d.	n.d.	100	26	100	20	n.d.	17	9	9	n.d.	n.d.	0	0	3	n.d.	n.d.	11	16	3	9	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Enterobacter	420	n.d.	n.d.	100	99	30	26	n.d.	100	25	25	25	n.d.	1	0	1	n.d.	n.d.	4	11	2	1	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Proteus	689	n.d.	n.d.	52	33	30	4	n.d.	16	5	5	5	n.d.	9	0	7	n.d.	n.d.	15	26	n.d.	28	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
P. aeruginosa	588	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	13	12	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	9	11	12	4	4	n.d.	2	12	n.d.	n.d.	n.d.	11	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.

Resistenz < 10%
Resistenz 10-49%
Resistenz >=50%
n.d. nicht getestet

*1: Ampicillin/Sulbactam, Piperacillin/Tazobactam, Cefazolin, Cefuroxim, Cefotaxim, Ceftriaxon, Imipenem, Meropenem sind von Oxacillin/Cefoxitin abgeleitet

*2: Ampicillin/Sulbactam, Piperacillin, Piperacillin/Tazobactam sind von Ampicillin abgeleitet