

Resistenzlage Klinikum Neukölln 2019

Zeitraum: 01.01.2019 bis 31.12.2019

Anteil der resistent getesteten Erreger in Prozent (%)

	Anzahl Testungen	Penicillin	Oxacillin	Ampicillin	Ampicillin/Sulbactam	Piperacillin	Piperacillin/Tazobactam	Cefazolin	Cefuroxim	Cefotaxim	Ceftriaxon	Ceftazidim	Aztreonam	Imipenem	Meropenem	Gentamicin	Gentamicin HL	Tobramycin	Ciprofloxacin	Moxifloxacin	Tigecyclin	Co-Trimoxazol	Colistin	Vancomycin	Teicoplanin	Erythromycin	Clindamycin	Linezolid	Rifampicin	Fosfomycin	Daptomycin	Fusidinsäure
Staph. aureus ^{*1}	1452	n.d.	9	n.d.	9	n.d.	9	9	9	9	9	n.d.	n.d.	9	9	2	n.d.	2	17	14	0	2	n.d.	0	n.d.	18	16	0	0	1	0	3
Koagulase neg. Staphylokokken ^{*1}	1329	n.d.	51	n.d.	51	n.d.	51	51	51	51	51	n.d.	n.d.	51	51	24	n.d.	25	38	26	0	20	n.d.	0	n.d.	54	38	0	4	43	0	31
Enterokokken ^{*2}	1080	n.d.	n.d.	26	26	26	26	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	26	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	100	n.d.	0	99	n.d.	9	4	n.d.	n.d.	0	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
E. coli	1955	n.d.	n.d.	47	43	47	15	n.d.	16	11	11	n.d.	n.d.	0	0	5	n.d.	n.d.	17	25	0	23	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Klebsiella	822	n.d.	n.d.	100	25	100	18	n.d.	15	8	8	n.d.	n.d.	1	1	3	n.d.	n.d.	10	15	8	9	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Enterobacter	435	n.d.	n.d.	99	98	23	20	n.d.	100	19	19	19	n.d.	1	1	1	n.d.	n.d.	4	7	2	4	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Proteus	667	n.d.	n.d.	51	30	25	2	n.d.	14	3	3	3	n.d.	10	0	6	n.d.	n.d.	10	52	n.d.	21	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
P. aeruginosa	513	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	18	16	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	11	15	19	8	3	n.d.	3	14	n.d.	n.d.	n.d.	8	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.

Resistenz < 10% Resistenz 10-49% Resistenz >=50% n.d. nicht getestet

*1: Ampicillin/Sulbactam, Piperacillin/Tazobactam, Cefazolin, Cefuroxim, Cefotaxim, Ceftriaxon, Imipenem, Meropenem sind von Oxacillin/Cefoxitin abgeleitet

*2: Ampicillin/Sulbactam, Piperacillin, Piperacillin/Tazobactam sind von Ampicillin abgeleitet