

Resistenzlage Klinikum Spandau 2019

Zeitraum: 01.01.2019 bis 31.12.2019

Anteil der resistent getesteten Erreger in Prozent (%)

	Anzahl Testungen	Penicillin	Oxacillin	Ampicillin	Ampicillin/Sulbactam	Piperacillin	Piperacillin/Tazobactam	Cefazolin	Cefuroxim	Cefotaxim	Ceftriaxon	Ceftazidim	Aztreonam	Imipenem	Meropenem	Gentamicin	Gentamicin HL	Tobramycin	Ciprofloxacin	Moxifloxacin	Tigecyclin	Co-Trimoxazol	Colistin	Vancomycin	Teicoplanin	Erythromycin	Clindamycin	Linezolid	Rifampicin	Fosfomycin	Daptomycin	Fusidinsäure
Staph. aureus *1	943	n.d.	9	n.d.	9	n.d.	9	9	9	9	9	n.d.	n.d.	9	9	1	n.d.	1	19	17	0	1	n.d.	0	n.d.	16	15	0	0	1	1	3
Koagulase neg. Staphylokokken *1	526	n.d.	52	n.d.	52	n.d.	52	52	52	52	52	n.d.	n.d.	52	52	26	n.d.	26	40	39	0	22	n.d.	0	n.d.	61	44	1	3	40	0	34
Enterokokken *2	524	n.d.	n.d.	24	24	24	24	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	24	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	100	n.d.	0	100	n.d.	11	6	n.d.	n.d.	0	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
E. coli	997	n.d.	n.d.	46	43	44	15	n.d.	18	13	13	n.d.	n.d.	0	0	6	n.d.	n.d.	20	26	1	21	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Klebsiella	452	n.d.	n.d.	100	21	100	15	n.d.	14	9	9	n.d.	n.d.	1	1	4	n.d.	n.d.	9	15	7	9	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Enterobacter	195	n.d.	n.d.	100	100	29	25	n.d.	100	25	25	25	n.d.	0	0	0	n.d.	n.d.	2	8	9	3	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Proteus	334	n.d.	n.d.	51	32	29	4	n.d.	15	5	5	5	n.d.	10	0	8	n.d.	n.d.	14	52	n.d.	26	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
P. aeruginosa	353	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	20	17	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	13	19	22	9	3	n.d.	1	14	n.d.	n.d.	n.d.	14	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.

Resistenz < 10%

Resistenz 10-49%

Resistenz >=50%

n.d. nicht getestet

*1: Ampicillin/Sulbactam, Piperacillin/Tazobactam, Cefazolin, Cefuroxim, Cefotaxim, Ceftriaxon, Imipenem, Meropenem sind von Oxacillin/Cefoxitin abgeleitet

*2: Ampicillin/Sulbactam, Piperacillin, Piperacillin/Tazobactam sind von Ampicillin abgeleitet